


Решения
Заключительный тур олимпиады Росатом,
физика, 7 класс
2017-2018 учебный год

1. Вес ведерка, до краев заполненного водой, равен $P_1 = 20$ Н. В ведерко кладут камень, плотность которого втрое больше плотности воды и который полностью погружается в воду. Вес ведерка становится равным $P_2 = 24$ Н. Каким будет вес ведерка, если из него аккуратно вытащить первый камень, а положить другой камень, с той же плотностью, но с вдвое меньшим объемом, чем у первого.


2. Винни Пух пошел в гости к Пятачку. Перед выходом Винни заметил, что его настенные часы стоят, показывая время 10 часов 15 минут. Поскольку Винни не знал точного времени, он завел часы, не переводя стрелок. Когда Винни Пух пришел к Пятачку, он увидел, что часы в доме Пятачка показывали время 14 часов 30 минут. Винни ушел от Пятачка в 15 часов 10 минут. Когда Винни вернулся домой, его часы показывали 14 часов 20 минут. Увидев это, Винни Пух сразу же выставил на своих часах точное время. Какое время он выставил на своих часах?

3. Кубик составили из двух частей, имеющих разную плотность (см. рисунок). Одна часть, плотность которой равна ρ_1 , составляет третью часть объема кубика, но четвертую часть его массы. Найдите плотность второй части кубика.



4. Нечестный спортсмен при подготовке к Олимпийским играм принимал допинг, который позволял достигать очень высокой скорости, но при медленном разгоне. В результате спортсмен бежал дистанцию $l = 100$ м по следующему графику: в начале каждой следующей секунды он мгновенно увеличивал свою скорость на величину $\Delta v = 1,8$ м/с (до начала первой секунды его скорость была нулевой). На какое время обгонит или отстанет этот спортсмен от своих конкурентов, которые бегут с постоянной скоростью $v = 10$ м/с?

5. Два одинаковых цилиндрических сосуда соединены в самом низу тонкой трубкой, перекрытой краном. Вторая узкая трубка соединяет сосуды на высоте h . В сосуды налита – жидкость плотности ρ в одно колено, и жидкость плотности 6ρ в другое, причем высота слоя жидкости с плотностью ρ равна h , плотности 6ρ – $h/2$. Кран открывают. Найти высоту столба легкой жидкости в том сосуде, где первоначально была только тяжелая жидкость.



Решения

1. Камень вытеснит такое количество воды, объем которого равен его объему. Эта вода выльется из ведра. Поэтому увеличение веса ведерка равно

$$P_2 = P_1 + (\rho_k - \rho_e) g V = P_1 + (3\rho_e - \rho_e) g V = P_1 + 2\rho_e g V$$

где ρ_k и ρ_e - плотности камня и воды соответственно, V - объем камня. Отсюда

$$\rho_e g V = \frac{P_2 - P_1}{2} \quad (*)$$

Когда мы вытащим из ведерка первый камень и положим другой камень меньшего объема, часть ведерка объемом $V/2$ окажется ничем не заполненной. Поэтому вес ведерка будет равен

$$P_3 = P_1 + (\rho_k - \rho_e) g \frac{V}{2} - \rho_e g \frac{V}{2} = P_1 + 2\rho_e g \frac{V}{2} - \rho_e g \frac{V}{2} = P_1 + \rho_e g \frac{V}{2}$$

Поэтому из (*) получим

$$P_3 = P_1 + \frac{P_2 - P_1}{4} = \frac{3P_1 + P_2}{4} = 21 \text{ Н}$$

2. Обозначим время, стоящее на часах Винни Пуха, как t_1 (10 часов 10 минут), время, которое он увидел, прия к Пятачку - t_2 (14 часов 30 минут) время, когда он ушел от Пятачка - t_3 (15 часов 10 минут), время, которое он увидел на своих часах, когда вернулся - t_4 (14 часов 20 минут).

Очевидно, все путешествие Винни Пуха заняло время $t_4 - t_1$. Из них $t_3 - t_2$ он провел у Пятачка. Следовательно, на дорогу в каждый конец он затратил

$$\tau = \frac{1}{2}(t_4 - t_1 - (t_3 - t_2)) = \frac{1}{2}(t_4 - t_1 - t_3 + t_2) = 1 \text{ час } 45 \text{ мин}$$

Поэтому в тот момент, когда часы Пуха показывали $t_1 = 10.10$ точное время составляло

$$t_2 - \tau = 12.45$$

Следовательно, часы Пуха нужно перевести на 2 часа 35 минут вперед. То есть, когда часы Пуха показывали 14.20 точное время составляло 16.55. Это время и поставил на своих часах Винни Пух, когда вернулся.

3. Пусть объем всего кубика V , а плотность его второй части - ρ_2 . Тогда из условия имеем

$$\rho_1 \frac{V}{3} + \rho_2 \frac{2V}{3} = 4\rho_1 \frac{V}{3}$$

Решая это уравнение относительно ρ_2 , получаем

$$\rho_2 = \frac{3}{2} \rho_1$$

4. Конкуренты нечестного спортсмена пробегут стометровку за время

$$t = \frac{l}{v} = 10 \text{ с.}$$

Найдем, за какое время пробежит стометровку нечестный спортсмен. Поскольку в течение первой секунды он бежит со скоростью Δv , в течение второй секунды - $2\Delta v$, третьей - $3\Delta v$ и т.д., за 10 секунд он пробежит расстояние

$$S = \Delta v \Delta t + 2\Delta v \Delta t + \dots + 10\Delta v \Delta t = 55\Delta v \Delta t = 99 \text{ м}$$

где $\Delta t = 1$ с. Таким образом, нечестный спортсмен за 10 секунд пробежит 99 м, а последний метр дистанции, он пробежит со скоростью $11\Delta v$ и, следовательно, затратит на его прохождение время

$$t_1 = \frac{1(\text{м})}{11\Delta v} = 0,05 \text{ с}$$

Значит, нечестный спортсмен отстанет от своих конкурентов на время $t_1 = 0,05$ с.

5. Давление около дна сосуда с тяжелой жидкостью ($p = 6\rho gh / 2 = 3\rho gh$) больше давления около дна в сосуде с легкой жидкостью ($p_1 = \rho gh$). Поэтому при открывании крана тяжелая жидкость по нижней трубке будет перетекать в сосуд, в котором первоначально была легкая жидкость, которая в свою очередь по верхней трубке будет перетекать в сосуд с тяжелой жидкостью. Процесс перетекания будет происходить до тех пор, пока на выровняются давления около дна в левом и правом сосуде. Пусть

к этому моменту в сосуд с легкой жидкостью перетечет столб тяжелой жидкости высотой x . Тогда точно такой же слой легкой жидкости перетечет по верхней трубке в сосуд с тяжелой жидкостью, и условие равновесия жидкости в сосуде дает

$$6\rho g(h/2 - x) + \rho gx = 6\rho gx + \rho g(h - x)$$

Отсюда

$$x = \frac{h}{5}$$