

Вариант № 1

1. На проволоку в форме окружности радиуса 6 нанизаны 5 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 4 бусинки начали двигаться со скоростью $\frac{\pi}{2}$ (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 48 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x; y)$ их вершин являются решениями системы $\begin{cases} \sin(x+y) = \cos(2x-y) \\ \cos(x-y) = \sin(x+2y) \end{cases}$; 2) координаты $(x; y)$ граничных точек

являются решениями объединения $\begin{cases} \sin(x+y) = \cos(2x-y) \\ \cos(x-y) = \sin(x+2y) \end{cases}$. Найти наименьшее возможное значение площади таких параллелограммов.

3. Известно, что дробь $\frac{m(n+69m)}{n(m+69n)}$ сократима для некоторых взаимно простых целых чисел m и n .

Найти наибольшее простое число d , на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N . Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не больше половины площади треугольника ABC .

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} (x^2 + y^2 - 25)(4x + 3y - 25) = 0 \\ (x - 6\cos a)^2 + (y - 6\sin a)^2 = 1 \end{cases}$ имеет единственное решение?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCD A' B' C' D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB = 2$, $AD = 2\sqrt{2}$, $AA' = 4$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно $2\sqrt{2}$. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Вариант № 2

1. На проволоку в форме окружности радиуса 8 нанизаны 6 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 5 бусинок начали двигаться со скоростью π (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 96 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x; y)$ их вершин являются решениями системы $\begin{cases} \sin(x+3y) = \cos(2x-y) \\ \cos(x-y) = \sin(3x-2y) \end{cases}$; 2) координаты $(x; y)$ граничных

точек являются решениями объединения $\begin{cases} \sin(x+3y) = \cos(2x-y) \\ \cos(x-y) = \sin(3x-2y) \end{cases}$. Найти наименьшее возможное значение площади таких параллелограммов.

3. Известно, что дробь $\frac{m(n+73m)}{n(m+73n)}$ сократима для некоторых взаимно простых целых чисел m и n .

Найти наибольшее простое число d , на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N . Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не меньше трети площади треугольника ABC .

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} (x^2 + y^2 - 16)(x + y - 4\sqrt{2}) = 0 \\ (x - 5\cos a)^2 + (y - 5\sin a)^2 = 1 \end{cases}$ имеет два различных

решения?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCD A' B' C' D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB = \sqrt{2}$, $AD = 3$, $AA' = 4$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно 2. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Вариант № 3

1. На проволоку в форме окружности радиуса 10 нанизаны 7 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 6 бусинок начали двигаться со скоростью $\frac{\pi}{3}$ (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 120 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x; y)$ вершин являются решениями системы $\begin{cases} \sin(x+2y) = \sin(2x-3y) \\ \cos(3x+y) = \cos(x-2y) \end{cases}$; 2) координаты $(x; y)$ всех

граничных точек являются решениями объединения $\begin{cases} \sin(x+2y) = \sin(2x-3y) \\ \cos(3x+y) = \cos(x-2y) \end{cases}$. Найти наименьшее

возможное значение площади параллелограмма.

3. Известно, что дробь $\frac{m(n+83m)}{n(m+83n)}$ сократима для некоторых взаимно простых целых чисел m и n .

Найти наибольшее простое число d , на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N . Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не больше четверти площади треугольника ABC .

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} (x^2 + y^2 - 169)(12x + 5y - 169) = 0 \\ (x - 14\cos a)^2 + (y - 14\sin a)^2 = 1 \end{cases}$ имеет три различных

решения?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCD A' B' C' D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB = 3$, $AD = 3\sqrt{2}$, $AA' = 5$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно $3\sqrt{2}$. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

1. На проволоку в форме окружности радиуса 12 нанизаны 8 одинаковых бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени 7 бусинок начали двигаться со скоростью $\frac{\pi}{4}$ (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшаяся бусинка – с той же скоростью в обратном направлении. После столкновения любых двух бусинок величина скорости их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за 192 сек.?

2. На плоскости расположено множество параллелограммов, для которых 1) координаты $(x; y)$ вершин являются решениями системы $\begin{cases} \cos(x+3y) = \cos(2x+y) \\ \sin(2x-y) = \sin(x+4y) \end{cases}$; 2) координаты $(x; y)$ всех

граничных точек являются решениями объединения $\begin{cases} \cos(x+3y) = \cos(2x+y) \\ \sin(2x-y) = \sin(x+4y) \end{cases}$. Найти наименьшее возможное значение площади параллелограмма.

3. Известно, что дробь $\frac{m(n+79m)}{n(m+79n)}$ сократима для некоторых взаимно простых целых чисел m и n .

Найти наибольшее простое число d , на которое делится числитель и знаменатель дроби.

4. На сторонах BA и BC треугольника ABC совершенно случайно взяты точки M и N . Найти вероятность того, что площадь треугольника BMN окажется не меньше пятой части площади треугольника ABC .

5. При каких значениях a система уравнений $\begin{cases} (x^2 + y^2 - 36)(x\sqrt{3} + y - 12) = 0 \\ (x - 8\cos a)^2 + (y - 8\sin a)^2 = 4 \end{cases}$ имеет не менее двух

различных решений?

6. Расстоянием между двумя точками на поверхности прямоугольного параллелепипеда $ABCD A' B' C' D'$ называют наименьшую длину ломаной на поверхности, соединяющей эти точки.

По поверхности параллелепипеда с размерами $AB = 3\sqrt{2}$, $AD = 7$, $AA' = 8$ ползет муравей так, что расстояние на поверхности между ним и вершиной A всегда постоянное и равно 6. Нарисовать замкнутую траекторию движения муравья по поверхности параллелепипеда и найти ее длину.

Решения и ответы

Вариант 1

Задача 1. Ответ: $k = 16$ столкновений.

На проволоку в форме окружности радиуса R нанизаны m бусинок, равноотстоящих друг от друга. В некоторый момент времени $(m-1)$ бусинку заставили двигаться с одинаковой скоростью v (1/сек) в направлении против часовой стрелки, а оставшуюся бусинку – с той же скоростью в обратном направлении. Полагается, что после столкновения двух бусинок скорость их движения сохраняется, а направление мгновенно меняется на противоположное. Сколько столкновений произойдет между бусинками за T сек.?

Ответ: $k = \frac{T \cdot v \cdot (m-1)}{2\pi R}$

Решение. На рис 1 изображено движение двух бусинок A и B до соударения. На рис 2 – после соударения.




Рис 1




рис 2




рис 3

Так как бусинки по виду одинаковые, то поменяв на рис 2 буквы A и B местами, можно интерпретировать столкновение как переход бусинки A через бусинку B (рис 3). За один оборот окружности по часовой стрелке образ бусинки A совершает $(m-1)$ столкновение. С учетом относительности движения, один оборот совершается за $\frac{2\pi R}{2v} = \frac{\pi R}{v}$ сек. Если число T ему кратно, то

за время T совершается $\frac{T \cdot v}{\pi R}$ полных оборотов, что сопровождается $\frac{T \cdot v}{\pi R} \cdot (m-1)$ столкновениями. В

варианте 1 $m = 5, v = \frac{\pi}{2}$ (1/сек), $R = 6, T = 48$

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{9}$

Решение. Решением первого уравнения $\sin(x+y) = \cos(2x-y)$ системы является два семейства параллельных прямых на плоскости:

$$\sin(x+y) = \cos(2x-y) \rightarrow \begin{cases} 2x-y = \frac{\pi}{2} - x-y + 2\pi n \\ 2x-y = x+y - \frac{\pi}{2} + 2\pi m, m, n \in Z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3} \quad (1.*) \\ x-2y = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m \quad (1.**)$$


Решением второго уравнения $\cos(x-y) = \sin(x+2y)$ системы также являются два семейства параллельных прямых:

$$\cos(x-y) = \sin(x+2y) \rightarrow \begin{cases} x-y = \frac{\pi}{2} - x-2y + 2\pi k \\ x-y = x+2y - \frac{\pi}{2} + 2\pi s, k, s \in Z \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x+y = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad (2.*) \\ y = \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi s}{3}, \quad (2.**)$$

Расстояния между параллельными прямыми в каждом семействе указаны в таблице

(1,*)	(1,**)	(2,*)	(2,**)
$d_1 = \frac{2\pi}{3}$	$d_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}$	$d_3 = \frac{2\pi}{\sqrt{5}}$	$d_4 = \frac{2\pi}{3}$

Возможны шесть ($C_4^2 = 6$) случаев образования параллелограммов, удовлетворяющих условию задачи.



$$S = \frac{h \cdot H}{\sin \alpha}$$

Случай 1. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству (1,*) и (2.*).
 Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств (1,*) и (2.*) соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1 = \{1; 0\}, n_2 = \{2; 1\}, \cos \alpha_1 = \frac{(n_1, n_2)}{|n_1||n_2|} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_1 = \frac{d_1 \cdot d_3}{\sin \alpha_1} = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \cdot \sqrt{5} = \frac{4\pi^2}{3}$

Случай 2. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству (1,*) и (2.**).
 Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств (1,*) и (2.***) соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1 = \{1; 0\}, n_2 = \{0; -1\}, \cos \alpha_1 = \frac{(n_1, n_2)}{|n_1||n_2|} = 0, \sin \alpha_1 = 1 \text{ (прямоугольник)}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_2 = \frac{d_1 \cdot d_4}{\sin \alpha_2} = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi^2}{9}$

Случай 3. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству (1,**) и (2.*).
 Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств (1,**) и (2.*) соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1 = \{1; -2\}, n_2 = \{2; 1\}, \cos \alpha_3 = \frac{(n_1, n_2)}{|n_1||n_2|} = 0, \sin \alpha_3 = 1 \text{ (прямоугольник)}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_3 = \frac{d_2 \cdot d_3}{\sin \alpha_3} = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{5}} = \frac{4\pi^2}{5}$

Случай 4. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству (1,**) и (2.**).
 Наименьший по площади параллелограмм из этой серии содержит пару соседних параллельных прямых из семейств (1,**) и (2.***) соответственно. Острый угол параллелограмма вычисляется через нормали боковых сторон:

$$n_1 = \{-1; 2\}, n_2 = \{0; 1\}, \cos \alpha_4 = \frac{(n_1, n_2)}{|n_1||n_2|} = \frac{2}{\sqrt{5}}, \sin \alpha_4 = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Его площадь вычисляется по формуле $S_4 = \frac{d_2 \cdot d_4}{\sin \alpha_4} = \frac{2\pi}{\sqrt{5}} \cdot \frac{2\pi}{3} \cdot \sqrt{5} = \frac{4\pi^2}{3}$

Случай 5. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству (1,**) и (1,*)

Наименьшая площадь параллелограммов $S_5 = \frac{2\pi^2}{3}$.

Случай 6. Параллельные стороны параллелограмма принадлежат семейству (2,**) и (2,*)

Наименьшая площадь параллелограммов $S_6 = \frac{4\pi^2}{3}$

Наименьшее значение площади параллелограмма соответствует S_2 .

Задача 3 Ответ: $d = 23$

Решение. По условию задачи дробь $\frac{m(n+69m)}{n(m+69n)}$ сократима для некоторых взаимно простых целых

чисел m и n . Пусть d это наибольшее простое число, на которое делится числитель и знаменатель заданной дроби. Так как m и n взаимно простые числа, то возможны 3 случая.

Случай 1. $\begin{cases} m = ad, \\ m + 69n = bd. \end{cases}$ Имеем $69n = bd - m = (b - a)d$. Следовательно, $69n$ делится на d . Так как m делится на d , то n не делится на d , поэтому на d должно делиться $69 = 3 \cdot 23$. В данном случае наибольшее значение $d = 23$. Этот случай реализуется при $m = 23, n = 1$.

Случай 2. $\begin{cases} n = ad, \\ n + 69m = bd. \end{cases}$ Имеем $69m = bd - n = (b - a)d$. Здесь такая же ситуация, как в случае 1 (m и n меняются местами). Наибольшее значение d равно 23.

Случай 3. $\begin{cases} n + 69m = ad, \\ m + 69n = bd. \end{cases}$ Складывая и вычитая уравнения, получим

$$\begin{cases} n + m + 69(n + m) = (a + b)d, \\ n - m + 69(m - n) = (a - b)d, \end{cases} \text{ или } \begin{cases} 70(n + m) = (a + b)d, \\ 68(m - n) = (a - b)d. \end{cases}$$

Проанализируем последнюю систему.

а) $n + m$ и $n - m$ делятся на d . Тогда $(n + m) + (m - n) = 2m$ делится на d и $(n + m) - (m - n) = 2n$ делится на d . Так как мы ищем наибольшее простое d , то будем рассматривать $d > 23$, ($d = 23$ мы уже нашли). Тогда получаем, что m и n делятся на d , а это противоречит условию задачи.

б) $n + m$ не делится на d . Тогда 70 делится на d . Так как $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$, то наибольшее простое d это 7.


в) $n - m$ не делится на d . Тогда 68 делится на d . Так как $68 = 2 \cdot 2 \cdot 17$, то наибольшее простое d это 17.

Из рассмотренных выше случаев следует, что наибольшее значение $d = 23$.

Задача 4 Ответ: $P(A) = \frac{1 + \ln 2}{2}$


Решение. Введем обозначения: $BM = x \cdot BA, BN = y \cdot BC, x \in [0; 1], y \in [0; 1]$

По условию, независимые случайные величины x и y равномерно распределены на отрезке $[0; 1]$.



Случайная величина $S_{BMN} = xy \cdot S_{ABC}$. Случайное событие $S_{BMN} \leq \frac{S_{ABC}}{2}$ реализуется, если $xy \leq \frac{1}{2}$. На

рис изображено множество точек с координатами $(x; y)$ на квадрате $[0; 1] \times [0; 1]$, для которых $xy \leq \frac{1}{2}$.



Вероятность события $A = \left\{ (x, y) : xy \leq \frac{1}{2} \right\}$ равна площади заштрихованной части квадрата.

$$P(A) = \frac{1}{2} + \int_{0.5}^1 \left(\frac{1}{2x} \right) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln x \Big|_{x=0.5}^1 = \frac{1 + \ln 2}{2}.$$


Задача 5 Ответ: 1) $a \in \left(\arccos \frac{8-3\sqrt{5}}{15} + 2\pi k; -\arccos \frac{8+3\sqrt{5}}{15} + 2\pi(k+1) \right), k \in Z,$

2) $a = \arccos \frac{4}{5} + 2\pi k, k \in Z;$

Иная форма записи ответа

1) $a \in \left(\arccos \frac{4}{5} + \arccos \frac{2}{3} + 2\pi k; \arccos \frac{4}{5} - \arccos \frac{2}{3} + 2\pi(k+1) \right), k \in Z$

Решение. Множество точек с координатами $(x; y)$, удовлетворяющих первому уравнению системы, является объединением точек окружности $x^2 + y^2 = 25$ и прямой $4x + 3y = 25$, касающейся окружности в точке $(4; 3)$. Для каждого значения a множество точек, удовлетворяющих второму уравнению, представляет собой окружность радиуса 1 с центром в точке $(6 \cos a; 6 \sin a)$, расположенном на окружности радиуса 6 с центром в начале координат.



Прямая L с уравнением $4x + 3y = 25$ касается окружности K_1 в точке $A(4; 3)$, прямые P и Q параллельны L и равноотстоят от нее на расстояние 1. Точка B лежит на пересечении окружности K_3 и прямой P и является центром окружности K_2 , соответствующим значению параметра $a = \varphi$.

$$\varphi = \angle AOF + \angle DOB = \arccos \frac{4}{5} + \arccos \frac{2}{3}$$

$$\cos \varphi = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} - \sqrt{1 - \frac{4}{9}} \cdot \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{8 - 3\sqrt{5}}{15} \rightarrow \varphi = \arccos \frac{8 - 3\sqrt{5}}{15}$$

Точка W , симметричная точке B относительно прямой OA , соответствует значению параметра $a = \theta$:


$$\theta = 2\pi - \angle EOW = 2\pi - \arccos \frac{2}{3} + \arccos \frac{4}{5} \rightarrow \cos \theta = \frac{8 + 3\sqrt{5}}{15}$$

Для $a \in \left(\arccos \frac{8-3\sqrt{5}}{15} + 2\pi k; -\arccos \frac{8+3\sqrt{5}}{15} + 2\pi(k+1) \right), k \in Z$ окружность K_2 касается окружности

K_1 , но не касается прямой L . Эти значения параметра соответствуют случаю единственного решения системы. Помимо них единственное решение возникает при значении параметра $a = \arccos \frac{4}{5} + 2\pi k$, соответствующим случаю, когда центр окружности K_2 находится в точке C .

Задача 6 Ответ: $L = \frac{8\pi\sqrt{2}}{3}$

Решение.




Поскольку расстояние между точками на поверхности не меньше расстояния между этими точками в пространстве, на гранях $A'B'C'D'$ и $DD'C'C$ (кроме точки D) нет точек, где побывал муравей. Точку D , находящуюся на пути муравья, можно считать началом пути. Проследим движение муравья по доступным для него граням коробки.

Случай 1. Путь по грани $AA'D'D$.

Поскольку начало пути лежит в этой грани, траекторией его движения на этой грани является четверть окружности радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в точке A . Длина пройденного пути DE равна $\pi\sqrt{2}$.

Случай 2. Путь по грани $AA'B'B$.

Поскольку вершина A лежит в этой грани, траектория пути муравья по этой грани представляет собой дугу EF окружности радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в точке A .




$$\cos \alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow \alpha_1 = \frac{\pi}{4} \rightarrow \beta_1 = \frac{\pi}{4}.$$

Длина пути EF равна $\frac{1}{8}$ длины окружности радиуса $2\sqrt{2}$ т.е. $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$.

Случай 3. Путь по грани $BB'C'C$.


Выход траектории на грань $BB'C'C$ возможен через ребро BB' и ребро BC .

Случай 3.1. Развертка через ребро BB' .




На рис отмечены желтым цветом точки грани $BB'C'C$, отстоящие от точки A на расстояние по поверхности коробки не большем $2\sqrt{2}$, если переход на грань осуществляется через ребро BB' .

Случай 3.2. Развертка через ребро BC .



На рис отмечены желтым цветом точки грани $BB'C'C$, отстоящие от точки A на расстояние по поверхности не больше $2\sqrt{2}$, если переход на грань осуществляется через ребро BC . Объединяя случаи 3.1 и 3.2, получим множество точек грани $BB'C'C$ (отмечены на рис желтым цветом), расстояние которых по поверхности от точки A не больше $2\sqrt{2}$.



Точки дуг GN и GM удалены от вершины A на расстояние по поверхности меньше $2\sqrt{2}$, поэтому траектория движения муравья по грани $BB'C'C$ представляет собой объединение дуг FG и GH окружностей радиуса $2\sqrt{2}$ с центром в точке A . Вычислим длину кривой FGH . Треугольник AGO – прямоугольный с углом $\angle AGO = \frac{\pi}{6}$, $\angle GBC = \frac{\pi}{4}$, $\angle GAB = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{12} \rightarrow \angle FAB = \frac{\pi}{4} \rightarrow \angle FAG = \frac{\pi}{6}$.

Тогда длина кривой FGH равна $\frac{2\pi\sqrt{2}}{3}$.

Случай 4. Путь по грани $ABCD$. Аналогичен случаю 2 с длиной пути $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$.

Объединяя случаи 1-4, получим длину пути муравья

$$L = \pi\sqrt{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} + \frac{2\pi\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{8\pi\sqrt{2}}{3}$$

Вариант 2

Задача 1 Ответ: $k = 60$ столкновений

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{17}$

Задача 3 Ответ: $d = 73$

Задача 4 Ответ: $P(A) = \frac{2 - \ln 3}{3}$

Задача 5 Ответ: 1) $a = \arccos \frac{3}{5} + \frac{\pi}{4} + 2\pi k$, 2) $a = \frac{\pi}{4} - \arccos \frac{3}{5} + 2\pi k$, $k \in Z$

Задача 6 Ответ: $L = \frac{8\pi}{3}$

Вариант 3

Задача 1 Ответ: $k = 24$ столкновений

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{19}$

Задача 3 Ответ: $d = 83$

Задача 4 Ответ: $P(A) = \frac{1 + \ln 4}{4}$

Задача 5 Ответ: $a \in \left(\arccos \frac{12}{13} - \arccos \frac{6}{7} + 2\pi k, \arccos \frac{12}{13} + \arccos \frac{6}{7} + 2\pi k \right), a \neq \arccos \frac{12}{13} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Задача 6 Ответ: $L = 4\pi\sqrt{2}$

Вариант 4

Задача 1 Ответ: $k = 28$ столкновений

Задача 2 Ответ: $\frac{4\pi^2}{19}$

Задача 3 Ответ: $d = 79$

Задача 4 Ответ: $P(A) = \frac{4 - \ln 5}{5}$

Задача 5 Ответ: $a \in \left(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k \right), a \neq \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

Задача 6 Ответ: $L = 8\pi$